

Кузнецов А.А., Вербицкий В.С.,
Завьялова Н.В.

**ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ**

ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА

/ Минск /

Цель исследования — изучить значение ультразвукового исследования в выборе тактики лечения послеродового эндометрита.

Под наблюдением находилось 49 женщин. Обследованные родильницы были распределены на две группы — контрольную ($n=18$) и основную ($n=31$). Всем женщинам проводилось эхографическое исследование на аппарате «АЛОКА» ССД-630 (Япония) со второго по девятый день послеродового периода по общепринятой методике.

При проведении ультразвукового исследования у всех женщин основной группы отмечено замедление инволюции матки в динамике и наличие в полости матки неоднородных структур. Показаниями для выскабливания полости матки были кровотечение и остатки плодного яйца. Считаем активной хирургическую тактику патогенетически обоснованной. Ультразвуковое исследование способствует расширению показаний для выскабливания полости матки и повышению эффективности лечения послеродового эндометрита.

У всех родильниц нормализация температуры произошла в течение 3-х суток, у 12 женщин температура нормализовалась в день выскабливания.

При обследовании больных производилось бактериологическое исследование. Отмечено, что возбудителями послеродового эндометрита у 18 (58,06%) явилась ассоциация микроорганизмов.

Лечение послеродового эндометрита, подтвержденного ультразвуковым исследованием, при активной хирургической тактике продолжалось 8 дней, а при консервативном лечении — 14 дней.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что ультразвуковое исследование в диагностике послеродового эндометрита информативно, а активная хирургическая тактика способствует более быстрому выздоровлению больных.